

22 Φεβρουαρίου 2017

Γεωπόνε, πώς θα φροντίσουμε τις μουσμουλιές;

/ [Επιστήμες](#), [Τέχνες](#) & [Πολιτισμός](#)





photo: Φιλάρετος Ψημμένος

του Κώστα Λιονουδάκη

Είμαι σίγουρος ότι πολλοί έχετε στην αυλή σας μια μουσμουλιά και στεναχωριέστε γιατί τα μούσμουλα καφετιάζουν κάθε χρόνο. Η μουσμουλιά (*Eriobotrya japonica*) είναι σημαντικό καρποφόρο δέντρο στον κήπο μας, καθώς τα μούσμουλα είναι το πρώτο φρούτο που βγαίνει την άνοιξη (Μάρτιο-Απρίλη-Μάη). Κρίμα να μη μπορείτε να τα χαρείτε, ειδικά σε μια εποχή που υπάρχει σημαντικό έλλειμμα από φρέσκα φρούτα.

Ας δούμε, λοιπόν, το αίτιο του προβλήματος. Το καφέτιασμα των μούσμουλων οφείλεται στο φουζικλάδιο, την κυριότερη μυκητολογική ασθένεια της μουσμουλιάς που προσβάλλει καρπούς, φύλλα, άνθη και λιγότερο των βλαστούς. Ειδικά στους ανεπτυγμένους καρπούς εμφανίζονται σκοτεινόχρωμες ελαιοκαστανές κηλίδες, που ανάλογα με την ένταση της προσβολής μπορεί να καλύπτουν και ολόκληρο τον καρπό.

Η ασθένεια ευνοείται από τις βροχές και δροσιές που σημειώνονται λίγο πριν την άνθιση μέχρι και δύο εβδομάδες μετά την καρπόδεση, καθώς είναι καθοριστικές για την εκδήλωση και εξέλιξη της ασθένειας, οπότε από το τέλος του μήνα και μετά προετοιμαζόμαστε για τη σωστή φροντίδα της μουσμουλιάς.

Σχετικά με την αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστούμε:

- Συστηματική συλλογή και κάψιμο των προσβεβλημένων τμημάτων της μουσμουλιάς (φύλλων, καρπών και ανθέων)
- Συλλογή των προσβεβλημένων καρπών και φύλλων που έχουν πέσει στο έδαφος και καταστροφή με φωτιά

Ψεκασμός με βιολογικό χαλκούχο σκεύασμα (βορδιγάλειος πολτός ή υδροξείδιο του χαλκού) στα παρακάτω βλαστικά στάδια:

- Λίγο πριν την άνθιση
- Μετά την πτώση των πετάλων, μόλις σχηματιστούν τα καρπίδια
- 15 ημέρες μετά τον προηγούμενο

* Επισκεφθείτε το garden blog «Τα Μυστικά του Κήπου» (mistikakipou.gr), που επιμελείται ο γεωπόνος Κώστας Λιονουδάκης

Πηγή: bostanistas.gr